










Нигулин Саша

Дятлов Илья

Шаталов Сафрон





конкурс
семейного творчества
"мы с папулей"

семья
Ясавиевых

семья
Шуруповых

семья
Клим



семья
Закировых

семья
Шамаловых

Ростислав

Реакция Манту

Что такое реакция Манту?

Туберкулез Манту, как и туберкулез Дарье, антропофильная туберкулезная инфекция, вызванная микобактерией *Mycobacterium tuberculosis*. С помощью реакции Манту можно оценить как чувствительность организма к микобактерии туберкулеза, так и наличие туберкулеза в организме ребенка. Это делается для того, чтобы выявить, не является ли ребенок в контакте с туберкулезом, и своевременно начать лечение. Реакция Манту проводится ежегодно для всех детей в возрасте от 1 года до 14 лет.

Как и когда делают пробу Манту?

Первую пробу Манту делают в возрасте одного года. Далее эту процедуру проводят ежегодно. Если в этот период выявится микобактерия туберкулеза, ребенка направят в больницу для дальнейшего обследования. Если же реакция Манту отрицательная, ребенка направят в школу или детский сад. Пробу Манту делают в поликлинике, в которой наблюдается ребенок, или в детском саду, школе, детском лагере. Пробу Манту делают в поликлинике, в которой наблюдается ребенок, или в детском саду, школе, детском лагере. Пробу Манту делают в поликлинике, в которой наблюдается ребенок, или в детском саду, школе, детском лагере.

Специфика результатов реакции Манту

Как уже было сказано, оценка результатов реакции Манту проводится по характеру и размеру воспаления в месте введения туберкулина. Оптимальное время для оценки результатов - 3 суток (72 часа) после выполнения пробы.

Если на месте внутримышечного введения туберкулина никаких изменений не наблюдается, реакция Манту считается отрицательной. Если же появляются краснота и папула (уплотнение), реакция положительная. Размер уплотнения на коже может варьировать от 5 мм и диаметре до более 30 мм. Положительная реакция говорит о том, что организм ребенка встретился с микобактериями туберкулеза, но возрос не обязательно у ребенка у него заболевания.

Поскольку всем детям в роддоме делают профилактику туберкулеза (БЦЖ), то есть возрос обязательно, на выявление заболевания бактерии, у ребенка в раннем или позднем возрасте реакция Манту должна быть положительной в течение определенного срока.

Конкурс семейного творчества

„Мы с папулей
молны, что хотим“









Рыбников Ярослав



Максим А.

Айдар



